

Tabel 9: respons¹

	Parameter	Complete remissie	Partiële remissie	Progressieve ziekte
	Respons definitie:	Alle criteria nodig	Ten minste 2 criteria van A plus 1 criterium van B (minimale duur van 2 maanden)	Ten minste 1 criterium
A	Lymfadenopathie	Afwezig (geen \geq 1,5 cm)	\geq 50% afname vanaf start, geen toename of nieuwe laesies	\geq 50% toename vanaf start of vanaf respons
	Hepato/splenomegalie	Miltgrootte < 13 cm	\geq 50% afname vanaf start	\geq 50% toename vanaf start of vanaf respons
	B-symptomen	Afwezig	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Bloed lymfocyten	Normaal, <4,0 $10^9/l$	\geq 50% afname vanaf start	\geq 50% toename vanaf start (\geq 5,0x 10^9 /cellen)
B	Trombocyten	$\geq 100 \times 10^9/l$	$\geq 100 \times 10^9/l$ of \geq 50% toename vanaf start	\geq 50% afname vanaf start secundair aan CLL
	Hemoglobine	>6,8 mmol/l	>6,8 mmol/l of toename \geq 50% na start	Afname van >1,3 mmol/l vanaf start secundair aan CLL
	Beenmerg	Normocellulair, geen CLL cellen, geen B-lymfoide nodi	Aanwezigheid van CLL cellen of B-lymfoide nodi, of niet verricht	\geq 50% toename van CLL cellen

Literatuurverantwoording:

Er is gebruik gemaakt van onderstaande richtlijn zonder aanvullende systematische literatuuranalyse:

1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL Blood 2018; 131(25):2745-2760.
4. Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2021 Jan;32(1):23-33